

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПараСета 500 mg таблетки
ParaCeta 500 mg tablets

(парацетамол/paracetamol)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след три дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява ПараСета и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ПараСета
3. Как да приемате ПараСета
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ПараСета
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към Рег. № 20100504
Разрешение № 11-31681, 02-12-2015
Одобрение № /

1. Какво представлява ПараСета и за какво се използва

ПараСета 500 mg таблетки е обезболяващо и температуропонижаващо средство и се използва за симптоматично лечение на повечето състояния, свързани с лека до умерена болка и висока температура, напр. главоболие, включително мигрена, зъбобол, болки в гърба, ревматични и мускулни болки, менструални болки, болки при възпалено гърло.

Как действа ПараСета

ПараСета съдържа парацетамол - аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата). ПараСета не дразни стомаха.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ПараСета


Запомнете: ПараСета съдържа парацетамол.

Не приемайте с други лекарства, съдържащи парацетамол.

Не взимайте ПараСета, ако сте алергични към парацетамол или някоя от другите съставки.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете ПараСета, ако:

- имате бъбречно или чернодробно заболяване;
- взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин;
- взимате антикоагуланти - лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
- трябва да взимате обезболяващо средство всеки ден за продължителен период;
- сте имали проблем с дишането при употреба на това или подобно лекарство в миналото;



- злоупотребявате с алкохол;
- сте бременна или кърмите.

Бременност и кърмене

Епидемиологичните проучвания при бременност при човека не показват риск при употребата на парацетамол в препоръчаните дози.

Парацетамол се екскретира в майчиното мляко, но не в клинично значими количества. Наличните данни не показват, че парацетамол е противопоказан по време на кърмене.

3. Как да приемате ПараСета

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

За перорално приложение.

Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години:

2 (две) таблетки на всеки 4 часа при необходимост. Не взимайте на интервали по-кратки от 4 часа и не надвишавайте 8 таблетки (4000 mg парацетамол) за период от 24 часа.

Деца (от 6 до 12 години) – ½ (половин) до 1 (една) таблетка да се дава на всеки 4 часа при необходимост. Не трябва да се дават повече от 4 таблетки за 24 часа.

Не давайте на деца повече от 3 (три) дни без консултация с лекар.

Да не се дава на деца под 6-годишна възраст.

Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.

Да не се превишава препоръчаната доза.

Ако сте приели повече от необходимата доза ПараСета

Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре.

Ако сте пропуснали да приемете ПараСета

Приемете дозата, когато си спомните. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на ПараСета

Приемът на ПараСета може да се прекрати по всяко време, в зависимост от Вашето състояние.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:

- наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето;
- се появят язви в устата;
- сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
- имате неочаквано кървене или склонност към насиняване.



Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна Агенция по Лекарствата

ул. „Дамян Груев“ №8

1303 София

Тел.: + 359 2 890 34 17

Уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ПараСета

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ПараСета

- Активната съставка е парацетамол
- Другите съставки са: лактоза монохидрат, повидон, царевично нишесте, натриев нишестен гликолат (тип А), магнезиев стеарат, силициев диоксид, колоиден, безводен

Как изглежда ПараСета и какво съдържа опаковката

Всяка една картонена кутия ПараСета 500 mg таблетки се състои от 1 блистер, който съдържа 10 бели кръгли таблетки с делителна черта от едната страна.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД

бул. „Г.М.Димитров“ № 1, гр. София 1172, България

тел.: + 359 2 962 54 54

факс: + 359 2 960 37 03

e-mail: info@tchaikapharma.com

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с притежателя на разрешението за употреба:

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД

бул. „Г.М.Димитров“ №1, София 1172, България

тел. 02 / 962 54 54

факс: 02/ 960 37 03

e-mail: info@tchaikapharma.com

Дата на последно преразглеждане на листовката:

Октомври, 2015 г.

